

AUTOUR DU VÊLAGE : LIMITER LES RISQUES, ADOPTER LES BONS RÉFLEXES



La naissance est l'étape déterminante de la vie du veau. Le fœtus devient un veau viable par des changements brutaux : déclenchement de la respiration, régulation de la température, adaptations au milieu extérieur. D'autant plus qu'un veau naît **STERILE et VULNERABLE**, il faut tout mettre en œuvre pour bien conditionner sa survie immédiate et ultérieure.

Et cela commence par la gestion des vaches tarées. Le veau obtiendra une plus ou moins bonne **vigueur** lors de sa gestation.

Il est donc primordial que **la vache tarie soit bien nourrie, minéralisée, déparasitée** voire vaccinée.

Ensuite **les conditions de vêlage** doivent **être irréprochables**. Placer la vache prête à mettre bas dans un **box de vêlage** spécifique, qui n'est ni une infirmerie ni un box d'isolement ! **Ce box de vêlage** doit être supérieur à 15m² avec un point d'abreuvement et d'alimentation. Il doit être nettoyé, désinfecté avec une litière propre et sèche avant chaque vêlage

- Dans le but de limiter les agents infectieux à l'origine de diarrhées et d'omphalite pour le veau
- En prévention des métrites et mammites pour la vache

Le moment du vêlage nécessite **une surveillance maximale** pour **une intervention minimale**. Si une intervention est décidée cela doit se faire avec **des mesures hygiéniques strictes** : matériel d'aide au vêlage propre et désinfecté, tenue spécifique (gants, blouse à usage unique) bottes propres, vulve nettoyée et désinfectée...

Au bout d'une minute après vêlage le veau doit prendre une position sternale et levé sa tête.

Si ce n'est pas le cas il faut :

- **Faire respirer** l'animal en évacuant les liquides fœtaux encombrant les voies respiratoires (aspiration, pendre le veau par les pattes arrières, massage cardiaque si nécessaire)
- **Lutter contre l'hypothermie** : sécher l'animal, l'isoler du sol par un lit de paille, voire le réchauffer avec une lampe infrarouge ou une couverture

Dans tous les cas :

- **Désinfecter le nombril**. Après avoir vidé le sang par une action de pince de haut en bas, tremper le nombril dans une solution désinfectante iodée, plusieurs jours de suite jusqu'à ce que le nombril soit sec (environ 3j).

